


Sección de Imágenes

Enterotomografía

Distensión de la porción distal del íleon previo a la ostomía, sin estenosis a ese nivel. Trayecto fistuloso de aproximadamente 20 cm con descarga en región periumbilical que comunica con una colección de 20x10 mm de diámetro y con otro trayecto fistuloso intraabdominal que se relaciona

con íleon distal. Posteriormente sigue un trayecto en sentido caudal, terminando en una colección ubicada en la grasa meso-rectal con volumen de 10 cc aproximadamente, en comunicación con el ano. No hay evidencia de subtipo inflamatorio activo.

Imagen cortesía Dra. Beatriz Pernaletti



Paciente femenina de 35 años, con diagnóstico de Enfermedad de Crohn a los 9 años, Montreal A1, B3, L3, p. Ameritó la primera intervención quirúrgica a los 10 años y posteriormente 13 cirugías más por estenosis y fístulas, siendo la última a los 17 años, resultando en colectomía total con ileostomía definitiva. Posteriormente comenzó a eliminar gas y heces por fístula perianal, iniciando tratamiento con Infliximab en 2007 que cumplió por 8 años. En 2017 se realiza enteroTAC (Imagen), reiniciándose tratamiento con Infliximab y Azatrioprina. Actualmente se encuentra en remisión.